

DEO OPTIMO MAX.

211.

UNI ET TRINO,

VIRGINI DEIPARÆ, ET S. LUCÆ
Orthodoxorum Medicorum Patrono.

QUÆSTIO MEDICO-CHIRURGICA.

QUOD LIBETARIIS DISPUTATIONIBUS,

manè discutienda, in Scholis Medicorum, die Jovis duodecimæ
mensis Martii, anno Domini M. DCC. XLIV.

M. CLAUDIO-ANTONIO RENARD;
Doctore Medico, Præside.

Sua-nè Sclopetorum vulncribus Peculiariter competit tractatio?

I.



SOLUTAM extrinsecus fibrarum continuitatem, variis distinxere nominibus Medicinæ Antistites. Cruentam & recentem factam ab instrumento acuto re-tulso-vè, tum in molli, tum in durâ parte, vulnus appellaverunt. Huic, quæ ab obtulo eorpore est, absque sanguinis effusione, conrusionis nomen conti-git. Illa verò, quam patiuntur ossium partes fissura modò, modò fracturæ vocabitur. Tria hæcce primaria genera, innumeræ alix sequuntur varietates, proindeque divisiones & denominaciones, vel à figurâ, vel ab instrumento, vel ab organo læso, tandem à symptomatum syndrome desumendæ. Has inter pluribus titulis infamis est vulnure species quæ à sclopetis inferuntur. Corporis impellentis, adigentis, mira potentia, stupendus effectus, lædenti figura, parti læsæ subito impressa mutatio, multa indè frequentius contestaria mala, curatio laboriosa, anceps sanatio, nonnè denominarum modò speciem satis superque discriminant? Ecce tractandi methòdo etiam differret? Inhorruerint veluti ad monstrum qui truculento illo arinorum genere primi tacti sunt, aut cadentes aspe-xerunt, hæserint qui primi medicatrices manus adhibuerunt; præeunte fulgurè occæcati, ignis vestigia, ultionis notas cernere se somniaverint quidam, talium vulnurem arte majori pervi-caciâ, accidentiumque numero, ferociâ victi pulveris pyrii venenatam qualitatem accusave-rint; novæ Chirurgiæ auxilium imploraverint; quis pavorem, quis tot errores inasuetis non condonabit. Recti quædam in novis non decipi arduum etiam nunc. Lapsu temporis rediit intro-piditas; opinionones quædam Physica discussit, ast eadem remanet vulneris atrocitas. Cui ut tutò succurratur abstinendum à medelæ specialis indagine. Revocentur ad examen Sclopetorum vul-nera. Horum cum aliis vulneribus instituat comparatio; expenduntur similitudinis argu-menta; discrepantiæ signa, siquæ sint opponantur; accidentium quoque habeatur ratio, sic eruantur indicationes curativæ. Tractatio namque peculiaris non debetur, nisi vulncri in se spectato, aut accidentibus ex illo consequentibus.

I I.

PARTIUM carnosarum intactis nervis, vasis, tendonibus punctim solura cohesio, id est, vulnus simplex in homine sano, solam agglutinationem primis diebus postulat, obri-nendam partium approximatione, levi contentionè, simul & balsamicorum vulnerariorumque medicamentorum ope. Quod si profundè subrepit advèrtendum nè ora citius quàm fundus ipse, à quo tamèn semper procedit regerminatio consolidentur. Diducta circò reneantur filamento contorto, aut alio simili. Caucelâ pariter opus est, si vulnus in parte non ascendat, sed descendat. Quippe tum in fundo congregantur sordes circumquaque continèe depluentes. Cui incommodo iur obviàm fasciatione circa fundum arctiori, teniori ad partem supernam. Ubi verò incausum adhibetur, nè in fistulam vulnus abeat, fundus ut par est, aperiatur, non-nisi mundato vulnere, oclusoque priori foramine obrurandus. Solida autem nunquam pro-curabitur conglutinatio absquè extractione omnium extraneorum quæ ab instrumento vulnerant.

et, aut aliunde; post inflictum vulnus in eo possunt delitescere. Id exequendum accommodatio-
 operâ. Si vulnus sibi relictum alienam induerit formam, labia fuerint tumida, retorta, extre-
 mitates vasculorum disjunctæ retrocesserint, occalluerint, promotâ convenienter suppuratione,
 detumescunt, laxabuntur, mollescent, vitiosa pars a sanâ separabitur, vi vitæ decidet *eschara*;
 roseus in toto vulneris tractu reforescit color, ad pristinum reducitur status, cicatrix succe-
 det, glutinamenti terminus. In cunctis conveniunt ejusdem speciei vulnera casum inflicta. Secus
 quando non nihil de partium substantia deperditum est. In hoc casu ad redintegrationem ablati
 dirigenda primum curatio. Licet enim carnis regeneratio solius naturæ sit beneficium adjuvatur
 nihilominus medicaminum ut vocant *Sarcoticorum*, admotione, quæ partem fovendo copio-
 sorem succum invitant, allapsum suâ virtute in fibrâ cogunt & confirmant. Dantur aliæ
 vulnerum species quæ ob fibrarum directionem, certum quemdam partis situm requirunt, fu-
 turarum-ve restinacula. Quibus neglectis frustra tentatur læsionis reparatio. Si in deligatione
 quid immutant lauciati visceris prolapsus, aut liquoris qualiscumque in cava corporis, dilu-
 vium, in periculo plus minus instanti, attentione diligentique majori, manuum aut instru-
 mentorum appropriatorum artificiosâ administratione; summâ temporis longiori, breviori,
 tota differentia continetur. Cæterum eò securior, eò certior methodus, quò magis ad simpli-
 cem generalemque vulnus tractationem accedit. Nec à solitâ recedendum viâ cum instru-
 mentum penetrans ossa quoque in societatem vulneris trahit, dum modo aer sedulo arceatur,
 vitentur pinguis aëri nocentiora, ni *exfoliationis* urgeat necessitas, altera suppurationis species.
 Contusio secundum solutionis genus multum de vulnere participat, aut, si mavis, aggregatio
 est vulnuscule. Duplex dignoscitur: Levis, tunc Ecchymoma & suppuratio dicitur, sponte
 minimum, spirituosus focius evanescens, molestior, quando scilicet, subcute ex dilaceratis vas-
 sis congregata est humorum moles. Acerbiora sæpe lapidis quàm vulnus minuitur, nempe
 cum musculorum substantiam contrivit, sensiles membranas, nervos, tendones, violaret; hinc
 in parte perit functionum integritas, insolito pondere gravantur vicina collectioni organa, sique
 in aliis partibus functiones suffaminantur, aut interturbantur, tandem stagnando, putrescendo
 acies fluit humores, circumposita rodunt ac destruunt. Juncta vulneri contusio, quantum res
 ægri pessum-datura sit attendenti planum erit. Inflammationem facit, facit suppurationem
 concipiunt partes contusæ; in abscessus convertuntur quos gangæna plurimum ineluctabilis
 corrumpit. Hanc labem possunt etiam experiri viscera in corporis penetralibus abdita. Quo fato,
 affectionis indoles, lætæ parvis conditio, curationis idæa, remediolorum efficacia præmonstrant.
 A resolutione auspicienda est contusionis sanatio, cujus ope dum attenuati exhalant aut resor-
 bentur humores, ulteriori etiam vasorum læsioni prospicitur. Hanc in methodum tota ne spes
 reponatur, si vetant effusi copia, nimia partis dilaceratio, manibus verò accessus pateat, scarifi-
 catione, apertura, suppuratione sanescit. Aliquando pessimum membri status confestim ipsius ex-
 tirpationem suadet; supervenientia aliquando mala, ad eam cogunt devenire. Non raro hanc
 unam salutis anchoram relinquit ossium fractura, tertium solutionis genus. Quò major erit pati-
 tium divulsio, distractio, quò plura fragmenta, quò gravior erit tendonum, nervorum mem-
 branarum offensio; cum magna vasa erunt vulnerata, aut aderit ingens simul contusio, eò acius
 omnem omnino aliam tractationem respicit. Simplici fracturæ sola depositio in situm naturalem,
 restituturumque in situm retentionem, fasciationis beneficio, sufficit, ad novam enato callo ferrumi-
 nationem. Immenfa foret specierum in hoc genere descriptio, infinitus accidentium numerus,
 quæ nec adumbare aggredimur hic loci. Utriusque cognitionem dabit universalis vulnus do-
 ctрина. Accidentia autem vulnorum ablegamus ad sequentia, ubi de iis quæ Sclopetorum vul-
 nera comitantur, aut excipiunt acturi sumus. Paritas liquidem ex junctione magis elucescit.

I I I

VULNERIBUS Sclopetorum nullo sub respectu peculiarem competere tractationem dum
 subiungimus, Paradoxum nihil, nil à veritate abhorrens asserimus. Quartum quippè genus
 non constituunt. Facili negotio referuntur vel ad vulnus, vel ad contusionem, vel ad fracturam.
 Qualitate partium offensa etiam congruunt. Facies si non una omnibus est, haud obscura
 tamen emicant similitudinis lineamenta, quæ tutò ducunt ad assignandum ordinem prospici-
 endi. Immo si attendatur ad instrumentum & vulnerandi modum, larvæ nil erit reliquum, tota de-
 terahetur. Corpus obusum est, summâ vi adactum, quod impingit in substantiam, mollior res-
 terat, attamen resistentem. Hanc non diffingit, utpotè quæ impetui cedit laxior, tenerior;
 non discindit, desunt cuspis & acies, quæ le insinuet, quæ separet fibras; aut dilacerando ulter-
 rius penetrat, verius perforat. Parem subeunt distractionem partes in quas eadem directione ir-
 rumpit, donec omnem ejus velocitatem absumpserint. Interea dum vasa sanguifera quibus irri-
 gatur cutis carnisque contextus, comprimuntur, refugit undequaque contentus humor, rum-
 puntur, profluit; parè quidem, quando magnum vas sanguinem affatim non eructat. Aliæ
 qualescumque hoc stillicidium sponte brevi exsiccat. Etenim eodem momento vellicata nervo-
 rum filamenta vasorum lacinias contrahunt, occludunt orificia, quin & canalis diametrum
 stringunt, sanguini affluenti denegatur exitus, congregatur; ad ora vulneris fit inflammatio,

tumor; tensio, dolor. Sub indè ægrefcunt omnia, ni præfentis fentiant artis lenimentum. Monet ratio, docuit experientia, mitius procedere vulnere ex quibus larga fcatuerit hæmorrhagia: propterea quòd exinanitis è propinquo vafis certo certius inflammationis periculum averruncatur. Advertendum igitur duce analogià, ut de plagâ incruentâ prodeat vulnus cruentum. Suam reipfâ fymbolum confert humorum per alia loca evacuatio, fuam utiq; revulfo à parte læfâ, & in aliam derivatio; proindeque v. s. purgantibus, ut & aliis quæ fimilem fortifuntur effectum fua eft utilitas & fides. Quinam depletioni plus tribuendum promptè iudicabit, qui circuitus fanguinis leges & phænomena noverit. Nec prorfus omitienda eft in frigidantium & corroborantium, vulgò defenfivorum, exterior applicatio: modò nè aftrictoriâ & coagulante vi pollent. Sed ea ufus magis quam ratio huc ulq; determinarunt. Hactenus nè res vulneratorum in pejus tuerent, profpicere tentavimus, nec quidnam adhibuimus auxilii præter id quod vulneribus aut contufionibus prodeffe folet. Eadem pergamus viâ ad curationis reliquum. Vlnus fibi relictum fuperius exprefsimus, & quid molendum, ut crufta vaforum extremitates obducens cicatrici obftaculum, priùs excideret. Quid in contufionibus ubi partes commotæ & emortuæ fuppurationis artificio ab integris promptè divellendæ funt, vulneris de quo fermo eft infpectio, unum & idem indicat. Vivida impulfio, quâ fibras atterendo, rapidè fubimet viam pandunt glandes *Scelopetaria*, vaforum oftio laaniati fimbriati fimul constringendo elcharam accelerat, & quæ in vulnere cafim factò poft tres dies fuccrefcet, quam in ulcere fitulofò patierum callofitatem humorum acredo, temporis feries inducent, eodem instanti propignit. Totus igitur vulneris tractus ab initio medicamentis obliniendus eft fuppurationibus, plus minus actuoſis, ut abſumptis carnis vitiatæ, novæ ab omni puncto fibræ gemment. Contufionem in hac vulnere fpecie femp̃er adelfe, nemo fanus diffimulabit. Præfens arguitur oculorum teſtimonio: comprobatur abnormi fuppurationis illuvie, quâ remoras etiam partes violente commotionis participes fuiſſe deprehenditur. Stragem quippè impetus & commotio ſubſequens late propagant & diffundunt. Eadem idcirco operâ membranarum fibras ultra tonum extenſas, contortas, debilitarunt, humorum progreſſus interceperunt. Quibus adde nervos ſpaciè vibrantes, criſpatos; certè lentorem, ſtagnationem, inflammationem, &c. nullatenus vitare poterunt inſeſtam contufionis fobolem. Nec tam diras vaſtationes, tot ruinas, tantam malorum illadem ſolæ valent concitare à *Scelopetis* emiſſæ glandes. Lapides, ligna, aut alia quævis, dum membra contundunt & dilaniant, ſimiles quocidè renovant Tragedias. Nulla igitur habiâ ratione inftrumenti, ex remanentibus effluviis inſtituatur tractationis modus & proceſſus, qui in hac contufionis fpecie conſtante iidem eſſe debent ac in cæteris. Forſitan aliter fractura erit protrahenda, ſi gans *Scelopetaria* in os incidit, ipſum læſerit, conſpigerit. Nequaquam, Eſſentia- liter eadem eſt fractura. Licet, v. g. dilatandum fit exterius foramen, juſto anguſtius; vulnus ſit ampliandum, ut extraneæ, oſſium ſeſtuce eximantur exploratioque ſit commodior; pari ſemper aite opus eſt, ut oſſa conſcrveant. Uno verbo, qui probè fracturarum pericula dignoſcere promptus erit; qui callebit ipſis & aliis oſſium morbis efficaciter mederi, is certè ampliòr non indigebit ſcientiâ ut hoc telorum genere percuffis ſubveniat.

I V.

VERUM enim verò ſi nullas diſſimilitudinis notas revelavit vulnere in ſe ſpectatorum examen; quid impedit, nè quædam inter accidentia lateant, undè diverſæ tractationi neceſſitas evincatur. Non minus ex hac parte nimia fruſtratur curioſitas. Dicant, quæſo, nùm ex undans ſanguis aliter ſiſtendus? Nùm lacceſcentes convuſionis inſultus, aliter compellendæ, Nùm ſuperveniens tumor aliter avertendus, minnendus, diſſipandus? Nùm arte ſingulari & extraordinaria providendum nè gangræna partes exeat? Nùm inſectæ ſpeciali purgatione & tabe mundandæ ſint? Minimè geſtium. Quæcumque cauſa fanguinis alveos reſeraverit, ſemper injectis ſupernè vinculis, aut vaſorum ligaturâ, aut ſero candente, & aliis ejuſdem potentia, aut pulveribus ſtypticis profluenti frana erunt injicienda. Vaſis appeti capacitas, ſitus, natura, &c. uni ex allatis palmam ſemper assignabunt. Ubi parum proficiet, membri extirpatione commune ſemper erit vitæ retinendæ confugium. Aliundè ſæpè ſepidis cruſta quæ in hoc caſu vaſi adnaſcitur cum ſuperficie tenus comminuta eſt ipſius partes, ad tempus illud obſtinet, & obex addit ſanguini, modò ſiccis medicaminibus à celeriori fuppuratione defendenda. Membranæ partes, nervi, tendones ſemilaceri, in hac ſpecie, ut in reliquis, convuſiones ſolent accerere, oſſium contritorum aculeis, extraneorum moleſtâ titillatione eadem perennant. Nonnè ſedantur, ut in aliis, totali nervorum tendonumque exciſione, aut tenſas laxando partes productiori vulnere. Remittunt quoquè exemptis proritantibus. Hinc curandum nè acriorum admiffione applicata remedia exacuatur. Nec diverſitas exurgit ratione corporis extrahendi, ſivè glans ſit *Scelopetaria*, quæ non rarò ſine noxa reſiſta fuit: ſivè teli mucro de fixus, ſivè pars ſter hamatæ arundinis. Verus *Chirurgia* modos excogitaverat quibus hæc reveleret. Illos cautè adhibentem nunquam deſtituent. Nova inftrumenta, forſan habiliora, attamen ex priorum exemplari fabricaſſe laus ſit pence Neoreticis. Quis neſcit tenuiorem eſſe in poliendo quam in dedolando laborum. Frequentius quidem tamore ſtipantur *Scelopetorum* vul-

nera, sed non sola. Aliis in casibus usitata præscribantur remedia, in hoc pariter votis res succeder. Viget semper paritas sive pars à glande *Sclopetar* à, sive à lapide percutiatur. Gangrana depascens iisdem prædiis coarctabitur, altis nempe scarificationibus, ut remedium efficaciam vias ad ulquæ partes peringat & sensiles, sanas quasi lorice & protegat, sollicitaque Naturæ corruptarum separationem intendat; denique artus amputatione. Difficilius ad cicatricem perducuntur talia vulnera. Faciunt. Fodicata pars deturparur. Sæpè motus in membro perit. Quid indè? Periculi & laboris multum. At diversitatis vel levioris nò umbra quidem. Circulatis est vulneris ambitus, & à Chirurgiæ incunabulis adverterunt Medici, ulcera rotunda ægrius cicatrice coadunari. Ubicumque deperditio sit substantiæ ibi remanet, ut plurimum, fœda & inæqualis cicatrix. Morsu aboliti causa in destructam vulnere aut suppuratione musculorum compagem refundenda est. Refectis iisdem nervis vasiferis sanguiferis deficit nutritio, marcescunt subiectæ partes, stupent, rigescunt. Quin & sanationem proteclant incisiones quæ protendentæ sunt, sive ut concidat tumor, sive ut extraneum quid amoveatur. Nec ista differentiam innuunt: & contrà affinitatem, si aliundè peccaret, confirmarent, Quæ verò in deligatione impenditur temporis summa, vulneris gravitatem & contumaciam solummodò astruunt.

V.

URGEBUNT quidem offendentes agnitam diversitatem expostulasse variam methodum, quæ in libris de hoc argumento exaratis describitur. Titulis delusi ipsos evolvimus, differentias in eis indagavimus, nec ullas post lectionem suspicari darum fuit. Contendant pari jure inscripta de vulneribus pedum aut manuum volumina peculiare quid edocere nos posse; quod ex universali vulnere *Chirurgiâ* decerpere non sit. De vulneribus Sclopetorum egerunt Botalus & Maggias. In id toti sunt ut extra dubium ponant nec amburi partes, nec pulveri pyrio venenatam in esse qualitatem. In super accidentia & eventum graphicè notarunt, collegerunt diligenter. Verùm curationem cum cæteris, ratione indicationum, consentaneam tradiderunt. Veneniferorum animalium morsus aut insecta tela propriam artem expectant, veneni natura symptomatum differentias suscitât, *specificis* impugnandas. Qui verò in allatâ specie effigendis differentiis insudant, nodum in scirpo, aut in multatæ laureolam quærere videntur. In Medicis magna vis est *analogiæ*. Inflammatio quæcumque loca impetat, iisdem armis debellatur, quæ decreta causa subministrat; idè quòd intrâ oblectas partes eisdem concit tumultus. Enumerantur symptomata cuique parti propria, eo solum fine, ut quænam pars afficiatur, mente saltem, si non sensibus assequamur. Iidem esse debent tractatum de vulneribus limites. Exponant fideliter singulorum symptomata, mentem evellant ad præsentendos singulorum exitus; quid fugiendum præmoncant; sed à præcipiendâ curatione prudenter abstinant. Universalis Chirurgiæ regulis imbutos discernere sinant quâ nam viâ ad sanationem usque sit progredi. Artem longam nimis, viramque brevem esse in confesso est apud omnes. Per tot ambages, per tot discrimina deducere nos super sedcant. Labyrinthum edificant, cujus perplexos parietes, nò proprio filo adjuti remeare queunt. Raritas horum ce vulnerum in expertis & ignavis fucum faciat, admirationem moveat; nova & indicta prius detexisse sibi insulset glorientur. Nobis sufficiat viam præmunisse ad concludendum.

Ergò vulneribus Sclopetorum sua non competit Peculiariter tractatio.

DOMINI DOCTORES DISPUTATURI.

M. Theodorus Baron.

M. Leander Peaget.

M. Guillelmus - Josephus de Pèpine.

M. Andreas Cantwel, Regiæ societatis Londinensis socius.

M. Ludovicus-Alexander Vieillard, Pharmacis professor designatus.

M. Ludovicus-Hyeronimus Cosnier.

M. Benjamin-Ludovicus de Launymberts.

M. Ludovicus-Guillelmus le Monnier, è Regiâ Scientiarum Academiâ.

M. Joannes-Ludovicus le Thieulier, Regis Consiliarius in majori Consilio & in magnâ Regiæ Domûs & Franciæ Præfectorum Medicus ordinarius.

Proponebat Parisiis ANTONIUS LE CAMUS, Parisinus, Salutærrimæ Facultatis Parisiensis Baccalaureus, A. R. S. H. 1744, à sextâ ad meridiem.

Typis QUILLAU, Universitatis & Facultatis Medicinæ Parisiensis Typographi, 1744.